

胆道癌

□ GS療法(S-1+ゲムシタビン)

- ・ゲムシタビン 1000mg/m² Day1, 8
- ・S-1 60mg~100mg/日 1日2回朝・夕食後内服

| 体表面積 | 1回投与量 | 1日投与量 |
|--|--------|---------|
| 1.25 m ² 未満 | 30mg/回 | 60mg/日 |
| 1.25 m ² ~1.5 m ² 未満 | 40mg/回 | 80mg/日 |
| 1.5 m ² 以上 | 50mg/回 | 100mg/日 |

※3週間サイクル

□ ゲムシタビン単独療法

- ・ゲムシタビン 1000mg/m² 30分 Day1, 8, 15
- ※4週間サイクル

□ ゲムシタビン+シスプラチン療法

- ・シスプラチン 25mg/m² 60分 Day1, 8
 - ・ゲムシタビン 1000mg/m² 30分 Day1, 8
- ※3週間サイクル

□ エスワン単独療法

- ・S-1 80mg~120mg/日 1日2回朝・夕内服

| 体表面積 | 1回投与量 | 1日投与量 |
|--|--------|---------|
| 1.25 m ² 未満 | 40mg/回 | 80mg/日 |
| 1.25 m ² ~1.5 m ² 未満 | 50mg/回 | 100mg/日 |
| 1.5 m ² 以上 | 60mg/回 | 120mg/日 |

