

大腸癌

□ S-1 単独療法


・S-1 80mg~120mg/日

1日2回朝・夕食後内服 Day1~28

体表面積	1回投与量	1日投与量
1.25 m ² 未満	40mg/回	80mg/日
1.25 m ² ~1.5 m ² 未満	50mg/回	100mg/日
1.5 m ² 以上	60mg/回	120mg/日

※6週間サイクル

1コース6週間



□ UFT/ホリナート療法

・UFT 300~600mg/日 (300mg/m²を基準)

1日3回内服 Day1~28


体表面積	UFT 1日投与量	投与スケジュール (午前 - 午後 - 夜間)
1.17 m ² 未満	300mg/日	100mg-100mg-100mg
1.17 m ² ~1.49 m ² 未満	400mg/日	200mg-100mg-100mg
1.50 m ² ~1.83 m ² 未満	500mg/日	200mg-200mg-100mg
1.83 m ² 以上	600mg/日	200mg-200mg-200mg

・ホリナート 75mg/日

1日3回内服(1回25mg) Day1~28

※5週間サイクル

1コース5週間



※食事の前後1時間を避けて内服する。

□ カペシタビン単独療法(結腸癌における術後補助化学療法)

・カペシタビン 3000mg~4800mg/日 (B法)

1日2回朝・夕食後内服 Day1~14

体表面積	1回投与量(錠数)	1日投与量(錠数)
1.33 m ² 未満	1500mg(5錠)	3000mg(10錠)
1.33 m ² ~1.57 m ² 未満	1800mg(6錠)	3600mg(12錠)
1.57 m ² ~1.81 m ² 未満	2100mg(7錠)	4200mg(14錠)
1.81 m ² 以上	2400mg(8錠)	4800mg(16錠)

B法: 2500mg/m²/日

※3週間サイクル



□ XELOX療法(カペシタビン+オキサリプラチン)

・カペシタビン 2400mg~4200mg/日 (C法) Day1~14


1日2回朝・夕食後内服

体表面積	1回投与量(錠数)	1日投与量(錠数)
1.36 m ² 未満	1200mg(4錠)	2400mg(8錠)
1.36 m ² ~1.66 m ² 未満	1500mg(5錠)	3000mg(10錠)
1.66 m ² ~1.96 m ² 未満	1800mg(6錠)	3600mg(12錠)
1.96 m ² 以上	2100mg(7錠)	4200mg(14錠)

C法: 2000mg/m²/日

・オキサリプラチン 130mg/m² 120分 Day1

※3週間サイクル



□ ベバシズマブ+ XELOX 療法

- ・カペシタビン
 - ・オキサリプラチン
- 】 XELOX 療法と同じ

・ベバシズマブ 7.5mg/kg 初回 90 分, 2 回目 60 分, 3 回目以降 30 分 Day1

※3 週間サイクル

□ SOX 療法 (S-1+オキサリプラチン)

・S-1 80mg~120mg/日 Day1~14

1 日 2 回内服

体表面積	1 回投与量	1 日投与量
1. 25 m ² 未満	40mg/回	80mg/日
1. 25 m ² ~1. 5 m ² 未満	50mg/回	100mg/日
1. 5 m ² 以上	60mg/回	120mg/日

・オキサリプラチン 130mg/m² 120 分 Day1



※3 週間サイクル

□ ベバシズマブ+SOX 療法

- ・S-1
 - ・オキサリプラチン
- 】 SOX 療法と同じ

・ベバシズマブ 7.5mg/kg 初回 90 分, 2 回目 60 分, 3 回目以降 30 分 Day1

※3 週間サイクル



□ SIR療法 (S-1+イリノテカン)

・S-1 80mg~120mg/日 Day1~14

1日2回朝・夕食後内服

体表面積	1回投与量	1日投与量
1.25 m ² 未満	40mg/回	80mg/日
1.25 m ² ~1.5 m ² 未満	50mg/回	100mg/日
1.5 m ² 以上	60mg/回	120mg/日

・イリノテカン 150mg/m² 90分 Day1

※3週間サイクル

□ SIRB療法 (S-1+イリノテカン+ベバシズマブ)

・S-1 80mg~120mg/日 Day1~14



1日2回朝・夕食後内服

体表面積	1回投与量	1日投与量
1.25 m ² 未満	40mg/回	80mg/日
1.25 m ² ~1.5 m ² 未満	50mg/回	100mg/日
1.5 m ² 以上	60mg/回	120mg/日

・イリノテカン 150mg/m² 90分 Day1

・ベバシズマブ 7.5mg/kg 初回90分, 2回目60分, 3回目以降30分 Day1

※3週間サイクル



□ IRIS 療法 (S-1+イリノテカン)

・S-1 80mg~120mg/日 Day1~14

1日2回朝・夕食後内服

体表面積	1回投与量	1日投与量
1.25 m ² 未満	40mg/回	80mg/日
1.25 m ² ~1.5 m ² 未満	50mg/回	100mg/日
1.5 m ² 以上	60mg/回	120mg/日

・イリノテカン 125mg/m² 120分 Day1, 15

※4週間サイクル

□ ベバシズマブ+IRIS 療法 (S-1+イリノテカン)

・S-1 80mg~120mg/日 Day1~14



1日2回朝・夕食後内服

体表面積	1回投与量	1日投与量
1.25 m ² 未満	40mg/回	80mg/日
1.25 m ² ~1.5 m ² 未満	50mg/回	100mg/日
1.5 m ² 以上	60mg/回	120mg/日

・イリノテカン 100mg/m² 90分 Day1, 15

・ベバシズマブ 5mg/kg 初回90分, 2回目60分, 3回目以降30分 Day1

※4週間サイクル



□ XELIRI 療法(カペシタビン+イリノテカン)

・カペシタビン 2100mg~3600mg/日(添付文書外)Day1~14


1日2回朝・夕食後内服

体表面積	1日投与量(朝-夕)	1日投与量(錠数)
1.31 m ² 未満	(3錠-4錠)	2100mg(7錠)
1.31 m ² ~1.49 m ² 未満	(4錠-4錠)	2400mg(8錠)
1.50 m ² ~1.68 m ² 未満	(4錠-5錠)	2700mg(9錠)
1.69 m ² ~1.86 m ² 未満	(5錠-5錠)	3000mg(10錠)
1.87 m ² ~2.04 m ² 未満	(5錠-6錠)	3300mg(11錠)
2.05 m ² 以上	(6錠-6錠)	3600mg(12錠)

1600mg/m²/日(添付文書外)

・イリノテカン 200mg/m² 90分 Day1


※3週間サイクル



□ ベバシズマブ+ XELIRI 療法

・カペシタビン } XELIRI 療法と同じ
 ・イリノテカン }

・ベバシズマブ 7.5mg/kg 初回 90分, 2回目 60分, 3回目以降 30分 Day1




□ ベバシズマブ+カペシタビン療法

- ・ベバシズマブ 7.5mg/kg 初回 90 分, 2 回目 60 分, 3 回目以降 30 分 Day1
- ・カペシタビン

体表面積	1 回投与量 (錠数)	1 日投与量 (錠数)
1.36 m ² 未満	1200mg (4 錠)	2400mg (8 錠)
1.36 m ² ~1.66 m ² 未満	1500mg (5 錠)	3000mg (10 錠)
1.66 m ² ~1.96 m ² 未満	1800mg (6 錠)	3600mg (12 錠)
1.96 m ² 以上	2100mg (7 錠)	4200mg (14 錠)

C 法 : 2000mg/m²/日

※3 週間サイクル




□ ベバシズマブ+S-1 療法

- ・ベバシズマブ 7.5mg/kg 初回 90 分, 2 回目 60 分, 3 回目以降 30 分 Day1
- ・S-1 80mg~120mg/日 Day1~14

体表面積	1 回投与量	1 日投与量
1.25 m ² 未満	40mg/回	80mg/日
1.25 m ² ~1.5 m ² 未満	50mg/回	100mg/日
1.5 m ² 以上	60mg/回	120mg/日

※3 週間サイクル



□ mFOLFOX6 療法

- レボホリナート 200mg/m² 120 分 Day1
- オキサリプラチン 85mg/m² 120 分 Day1
- フルオロウラシル 400mg/m² 15 分 Day1
- フルオロウラシル 2400mg/m² 46 時間 Day1～2

} レボホリナートとオキサリプラチンは同時投与

※2 週間サイクル

□ mFOLFOX6+ベバシズマブ療法

- レボホリナート 200mg/m² 120 分 Day1
- オキサリプラチン 85mg/m² 120 分 Day1
- フルオロウラシル 400mg/m² 15 分 Day1
- フルオロウラシル 2400mg/m² 46 時間 Day1～2
- ベバシズマブ 5or10mg/kg 初回 90 分, 2 回目 60 分, 3 回目以降 30 分 Day1

} レボホリナートとオキサリプラチンは同時投与

※2 週間サイクル

□ FOLFIRI 療法

- レボホリナート 200mg/m² 120 分 Day1
- イリノテカン 150mg/m² 120 分 Day1
- フルオロウラシル 400mg/m² 15 分 Day1
- フルオロウラシル 2400mg/m² 46 時間 Day1～2

} レボホリナートとイリノテカンは同時投与

※2 週間サイクル

□ FOLFIRI+ベバシズマブ療法

- ・レボホリナート 200mg/m² 120 分 Day1
- ・イリノテカン 150mg/m² 120 分 Day1
- ・フルオロウラシル 400mg/m² 15 分 Day1
- ・フルオロウラシル 2400mg/m² 46 時間 Day1~2
- ・ベバシズマブ 5or10mg/kg 初回 90 分, 2 回目 60 分, 3 回目以降 30 分 Day1

} レボホリナートとイリノテカンは同時投与

※2 週間サイクル

□ CPT-11 (イリノテカン) 療法 A 法

- ・イリノテカン 100mg/m² 120 分 Day1. 8. 15

※5 週間サイクル

□ CPT-11 (イリノテカン) 療法 B 法

- ・イリノテカン 150mg/m² 90 分 Day1

※2 週間サイクル

□ UFT/ホリナート+ベバシズマブ療法

・UFT 300～600mg/日 (300mg/m²を基準) Day 1～21

1日3回内服


体表面積	UFT 1日投与量	投与スケジュール (午前 - 午後 - 夜間)
1.17 m ² 未満	300mg/日	100mg-100mg-100mg
1.17 m ² ～1.49 m ² 未満	400mg/日	200mg-100mg-100mg
1.50 m ² ～1.83 m ² 未満	500mg/日	200mg-200mg-100mg
1.83 m ² 以上	600mg/日	200mg-200mg-200mg

・ホリナート 75mg/日 Day1～21

1日3回内服(1回25mg)

・ベバシズマブ 5mg/kg 初回90分, 2回目60分, 3回目以降30分 Day1・15

※4週間サイクル



□ ロンサーフ単独療法

・ロンサーフ 70mg/m²/日 Day1～5 Day8～12

体表面積(m ²)	初回基準量
1.07 未満	35mg/回(70mg/日)
1.07 以上～1.23 未満	40mg/回(80mg/日)
1.23 以上～1.38 未満	45mg/回(90mg/日)
1.38 以上～1.53 未満	50mg/回(100mg/日)
1.53 以上～1.69 未満	55mg/回(110mg/日)
1.69 以上～1.84 未満	60mg/回(120mg/日)
1.84 以上～1.99 未満	65mg/回(130mg/日)
1.99 以上～2.15 未満	70mg/回(140mg/日)
2.15 以上	75mg/回(150mg/日)

※4週間サイクル

□ ロンサーフ+ベバシズマブ療法

・ロンサーフ 70mg/m²/日 Day2～6 Day9～13]用量はロンサーフ単独療法と同じ

・ベバシズマブ 5mg/kg 初回 90 分, 2 回目 60 分, 3 回目以降 30 分, Day1・15

※4週間サイクル