

膵臓癌

□ S-1 単独療法

・S-1 80mg~120mg/日 1日2回朝・夕食後内服

体表面積	1回投与量	1日投与量
1.25 m ² 未満	40mg/回	80mg/日
1.25 m ² ~1.5 m ² 未満	50mg/回	100mg/日
1.5 m ² 以上	60mg/回	120mg/日

※6週間サイクル

□ GS療法(S-1+ゲムシタビン)

・ゲムシタビン 1000mg/m² Day1,8

・TS-1 60mg~100mg/日 1日2回朝・夕食後内服

体表面積	1回投与量	1日投与量
1.25 m ² 未満	30mg/回	60mg/日
1.25 m ² ~1.5 m ² 未満	40mg/回	80mg/日
1.5 m ² 以上	50mg/回	100mg/日

※3週間サイクル

□ ゲムシタビン+タルセバ療法

・ゲムシタビン 1000mg/m² 30分 Day1,8,15

・タルセバ 100mg/日 1日1回連日内服

食事の1時間以上前又は2時間以降に内服する。


※4週間サイクル

□ ゲムシタビン+Nab-PTX療法

・ゲムシタビン 1000mg/m² 30分 Day1,8,15

・アブラキサン 125mg/m² 30分 Day1,8,15

※4週間サイクル



□ ゲムシタピン単独療法

- ・ゲムシタピン 1000mg/m² 30分 Day1,8,15

- ※4週間サイクル

□ ゲムシタピン+放射線療法

- ・ゲムシタピン 600mg/m² 30分 Day1,8,15

- ・放射線照射 2Gy×25日間 or1.8Gy×28日間

- ※4週間サイクル

□ S-1+放射線療法

- ・S-1 5日内服 2日休薬×5週間

体表面積	1回投与量	1日投与量
1.25 m ² 未満	40mg/回	80mg/日
1.25 m ² ～1.5 m ² 未満	50mg/回	100mg/日
1.5 m ² 以上	60mg/回	120mg/日

- ・放射線照射 2Gy×25日間 or1.8Gy×28日間

□ FOLFIRINOX療法

- ・レボホリナート 200mg/m² 120分 Day1

- ・イリノテカン 180mg/m² 90分 Day1

- ・フルオロウラシル 400mg/m² 15分 Day1

- ・フルオロウラシル 2400mg/m² 46時間 Day1～2

- ・オキサリプラチン 85mg/m² 120分 Day1

- ※2週間サイクル

□ nal-IRI+5-Fu/l-LV療法

- ・オニバイド 70mg/m² 90分 Day1

- ・レボホリナート 200mg/m² 120分 Day1

- ・5-Fu 2400mg/m² 23時間 Day1

- ※2週間サイクル