


リツキシマブの治療をお受けになる方へ

★治療スケジュール

症状や経過に合わせて治療スケジュールが変わることがあります。

お薬の名前	1日目	～ 日目
リツキシマブ (リツキシマブ) mg	 注1	お休み

注1
初回は点滴速度50mL/時間より開始。問題なければ30分毎に50mL/時間ずつ上げていきます。
2回目以降は100mL/時間で開始し、その後体調に変化がなければ30分毎に100mL/時間ずつ上げていきます。

インフュージョン・リアクションを予防するお薬

リツキシマブ投与 30 分前にお飲み下さい。

- ・カロナール錠 200mg 2錠
- ・レボセチリジン錠 5mg 1錠

★起こりやすい副作用 これらの副作用が、すべての方に起こるわけではありません。

〈血液検査からわかる副作用〉

白血球減少

白血球は体内へ進入した細菌から体を守る重要な役割があり、抗がん剤の影響で白血球が少なくなると、菌やウイルスに感染しやすくなります。

⇒日頃から手洗い、うがいなどの感染対策を！ 白血球が少ない時期は人ごみを避けましょう。



〈ご自身でわかる副作用〉

インフュージョン・リアクション

初回の点滴時にもっともおこりやすい症状です。点滴中に『寒気』『気分が悪い』『顔や体がかゆい』『息苦しい』『頭痛』などの症状がおこった時は、すぐにスタッフを呼んで下さい。

※B型肝炎の急激な悪化

B型肝炎ウイルスに罹患している方で、リツキシマブの治療中や治療終了後に、病状が急激に悪化することがまれにあります。血液検査等で十分に注意をしていますが、治療中や治療後に、強い倦怠感、黄疸（目や手足、尿などが黄色くなる）などの症状が現れた場合は、すぐにご連絡下さい。