

Ph(-)B-ALL213地固め療法①をお受けになる方へ

★治療スケジュール

※投与量・日数、休薬期間など変わる事があります。

薬の名前	日数	1日	2日	3日	4日	
グラニセトロン3mg デキサート40mg 生理食塩液100ml		30分間	30分間	30分間		
キロサイド_____mg ソリタT4号輸液500mL		3時間	3時間	3時間		
エトボシド_____mg 5%ブドウ糖液500ml		1時間	1時間	1時間		
グラニセトロン3mg		30分間	30分間	30分間		
キロサイド_____mg ソリタT4号輸液500mL		3時間	3時間	3時間		
ロイナーゼ_____単位 5%ブドウ糖液500mL					4時間	

公立藤岡総合病院 薬剤部

★起こりやすい副作用 これらの副作用が、すべての方に起こるわけではありません。

〈血液検査からわかる副作用〉

白血球減少

白血球は体内へ進入した細菌から体を守る重要な役割があり、治療開始後10～14日頃に最も少なくなり、菌やウイルスに感染しやすくなります。

⇒日頃から手洗い、うがいなどの感染対策を！ 白血球が少ない時期は人ごみを避けましょう。

貧血

副作用による貧血の場合、めまい、ふらつきなどの症状としてあらわれることがあります。場合によっては、薬で治療をしたり、輸血をすることもあります。



血小板減少

血小板は出血した時に血を止める働きがあります。血小板が少なくなると、歯肉からの出血や内出血、鼻血などがおこりやすくなります。

⇒血小板が少ない時期は、ケガをしないように注意して下さい。

〈ご自身でわかる副作用〉

脱毛

抗がん剤の種類や患者さん個人によって違いはありますか、治療開始2～3週間後から抜け始めます。髪以外の部分（まゆ毛、ひげ、体毛など）でも同様におこります。治療が終了すれば、少しづつですが生えてきます。

⇒脱毛が気になる場合は、医療用かつらやウィッグ、帽子などをお勧めします。

口内炎

治療開始1週間ほどで口の中や歯肉がしみる、ひりひりする、赤くなるといった症状が出ることがあり、うがいや歯や口腔用の軟膏を使うことがあります。痛くて食事がとれない場合は、病院へ連絡して下さい。

⇒こまめにうがいや歯みがきをして、口の中を清潔に保って下さい。

悪心・嘔吐・食欲不振

個人差の大きい副作用です。治療時期に合った吐き気止めを使います。ただし、水分もとれない場合は病院へ連絡して下さい。

⇒食欲がなくても、水分はしっかりとるようにして下さい。

下痢

1日3回以上の排便、もしくは明らかな排便回数の増加がみられた場合は、下痢止めを服用して下さい。下痢止めを2回服用しても、よくならない場合は、病院への連絡が必要です。

⇒脱水を防ぐために、下痢または軟便の時は、水分をしっかりとりましょう。

デキサメタゾン（ステロイド）による作用

胃が重くすっきりしなかったり（胃炎）、眠れなかったり（不眠）、血糖が高くなる（高血糖）などの症状が現れることがあります。

⇒症状が気になる場合は、主治医にご相談下さい。

結膜炎・角膜炎

目の充血、目のかゆみ、異物感、目やになどの症状が現れることがあります。結膜炎の予防にはステロイド点眼液（フルメトロン点眼液）を使用します。

シタラビン症候群

38℃以上の高熱が出る、だるくなる、筋肉・骨が痛む、皮疹、喉の痛みなどがみられることがあります。シタラビン中止により、ほとんどの症状は軽快します。

中枢神経障害

思うように歩けない、ことばが上手く話せない、筋力低下などの症状が現れることがあります。投与後3～12日目に現れることが多く、徐々に元の状態に回復します。



★すぐに連絡をいただきたい副作用

★「階段を登ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる」、「空咳が出る」、「発熱する」このような症状が急に現れる、または以前から症状があった場合は、症状が急に悪くなる。（間質性肺炎）

★「ふるえ」、「悪寒」、「38℃以上の発熱」、「肌のほてり」、「紅潮」（敗血症）

※ここに記載した副作用以外にも、体の異常を感じたら病院にご連絡ください。